



Özgün Araştırma / Original Article

Akciğer kanserinin tedavisinde periferik nöropati; Önemli bir komorbidite

Şenay Aydın¹, Cengiz Özdemir², Suna Aşkın Turan³, Yusuf Başer⁴, Murat Kıyık⁵

1 S.B.Ü. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji, İstanbul, Türkiye, ORCID: 0000-0003-4460-9056

2 S.B.Ü. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye, ORCID:

0000-0002-9816-8885 3 S.B.Ü. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji, İstanbul, Türkiye, ORCID: 0000-0002-2397-0179

4 S.B.Ü. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji, İstanbul, Türkiye, ORCID: 0000-0003-3817-3823

5 S.B.Ü. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye, ORCID: 0000-0001-8737-1418

Geliş: 24.04.2019; Revizyon; 16.07.2019; Kabul Tarihi: 22.07.2019

Öz

Amaç: Klinik pratigimizde akciğer kanseri tedavisinde uygulanan kemoterapi rejimlerine bağlı gelişen periferik noropatiler sık gözlenmektedir. Bu çalışmada kemoterapi tedavisi alan ve periferik noropati gelişen akciğer kanseri tanılı hastalarda klinik semptomlar ve elektrofizyolojik bulguların değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntemler: Ocak 2012- Ocak 2018 tarihleri arasında noroloji birimine konsulte edilen ve periferik noropati on tanısıyla elektromiyografi (EMG) incelemeleri yapılan akciğer kanseri tanılı hastaların demografik verileri, semptomları, norolojik muayeneleri, EMG bulguları ve tedavilerinde kullanılan kemoterapi ajanları retrospektif olarak gözden geçirildi. Noropatiye neden olabilecek diyabet esmellitus, uremi, tiroid hastalıkları ve diğer sistemik hastalıklara sahip olan hastalar çalışma dışında bırakıldı.

Bulgular: 371 (315, Erkek) hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 203'ünde (%54,7) pozitif duyuşal, 247'inde (%66,6) negatif duyuşal, 81'inde (%21,8) motor semptomlar ve 127 'inde (%34,2) ağrı semptomları mevcuttu. EMG ile saptanan polinöropati varlığına göre hastalar polinöropati olanlar Grup I (n:250, %67,4) ve olmayanlar Grup II (n:121, %32,6) olarak sınıflandırıldı. Grup I' de, 160 hastada (%43,1) duyuşal, 5 hastada (%1,3) motor, 85 hastada (%22,9) duyuşal ve motor liflerin birlikte etkilendiği polinöropati varlığı saptandı. Grup I' de negatif duyuşal semptomlar ile motor semptomlar, Grup II 'de dizestezi ve parestezi semptomları istatistiksel anlamlılıkta yüksek oranda gözlemlendi (p=0.001, p=0.001, p=0.001, p=0.001).

Sonuç: Akciğer kanseri tedavisinde uygulanan kemoterapi rejimlerine bağlı gelişen periferik nöropatilerde en sık duyuşal semptomlar gözlenmekte ve kemoterapi ajanına göre motor semptomlarda artış gözlenebilmektedir.

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, elektromiyografi, duyuşal semptomlar, kemoterapi rejimleri, toksik noropatiler

DOI: 10.5798/dicletip.620534

Yazışma Adresi / Correspondence: Şenay Aydın, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji, 34020, Zeytinburnu-İstanbul, Türkiye e-mail: aydin.senay@hotmail.com

YÖNTEMLER

Bu kesitsel tanımlayıcı çalışmada üçüncü basamak bir eğitim ve araştırma hastanesinden elde edilen veriler retrospektif olarak değerlendirildi. Ocak 2012-Ocak 2018 tarihleri arasında Nöroloji Kliniğine nöropati ön tanısıyla konsülte edilen ve elektromiyografi (EMG) incelemeleri yapılan akciğer kanseri tanılı olguların demografik verileri, semptomları, nörolojik muayene bulguları, elektrofizyolojik verileri ve aldıkları kemoterapi ajanları incelendi. Çalışma için klinik araştırmalar etik kurulundan (2018/1490) izin alındı.

Noropatiye neden olabilecek diyabet es mellitus, uremi, tiroid hastalıkları ve diğer sistemik hastalıklara sahip olan hastalar çalışma dışında bırakıldı. Polinöropati ön tanısı ile laboratuvarında yapılan EMG incelemesinde üst ekstremitelerde sağ medyan ve ulnar sinir duyuşal ve motor yanıtları, alt ekstremitelerde sağ peroneal ve tibial sinir motor yanıtları ile iki yanlı sural sinir duyuşal yanıtları ve H refleksi kayıtlarından oluşan standart EMG protokolü uygulanmış olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri ve nörolojik muayene bulguları, poliklinik ve EMG laboratuvarı kayıtlarından retrospektif olarak analiz edildi. Klinik bulguları ve EMG verileri kaydedilmiş olan hastaların yaş, cinsiyet, başvuru semptomları, başvuru sırasında yapılan nörolojik muayeneleri, kullanılan kemoterapi ajanları ve EMG bulguları kaydedildi.

Tüm hastaların semptomları negatif duyuşal, pozitif duyuşal, motor, dizestezi, parestezi ve ağrı varlığına göre sınıflandırıldı. Hastaların duyuşal semptomları spesifik uyarı kaynaklı bulguların varlığı ve yokluğu göre sınıflandırıldı. Basit nörolojik testleri içeren muayene bulgularında hiperestezi, hiperaljezi, allodini gibi pozitif duyuşal bulguların varlığı, hipoestezi veya hipoaljezi gibi negatif duyuşal bulguların varlığı ile herhangi bir uyarıcı

olmaksızın oluşan dizestezi (ağrılı his) ya da parestezi (ağrısız his) varlığı incelendi. Nörolojik muayenelerinde derin ve yüzeysel duyu kusurları, kas gücü kayıpları ve patolojik serebellar bulguları kaydedildi. Nörolojik muayenelerinde kas gücü kayıpları Medical Research Council (MRC) skalası ile belirlendi¹³.

İstatistik

İstatistiksel analiz için SPSS 22.0 (IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statisticsfor Windows, Version 22.0. Armonk, NY) kullanıldı. Tüm elde edilen verilerin minimum, maksimum, median, ortalama standart deviasyon, sıklık ve yüzde değerleri hesaplandı. Ortalamaların karşılaştırılmasında non-parametrik değerler için Mann-Whitney U testi ve parametrik değerler için T testi kullanıldı. Kategorik değişkenlerin analizinde ki-kare testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alındı.

BULGULAR

Ocak 2012-Ocak 2018 tarihleri arasında nöroloji polikliniğinde akciğer kanseri tanısı olan ve nöropati kliniği ile başvuran 783 hasta saptandı. Bu hastaların 99' unda diyabetesmellitus öyküsü, 53' ünde tedavi sırasında ortaya çıkmış ve sonrasında da tedavi ihtiyacı doğan hiperglisemi varlığı, 19'unda tiroid fonksiyon bozukluğu öyküsü mevcuttu. Ayrıca 241 hastada eksik veri olması nedeniyle toplam 412 hasta verisi çalışmadan çıkarıldı. Çalışmaya 31-77 (62 ± 8,59) yaş aralığında 315'i (%84,9) erkek, 56'sı (%15,1) kadın toplam 371 hasta dahil edildi. EMG ile saptanan polinöropati bulgularına göre hastalar polinöropati olanlar Grup I (n:250, %67,4), olmayanlar Grup II (n:121, %32,6) olarak sınıflandırıldı (Tablo 1). Grup I' de 160 (%43,1) hastada duyuşal, 5 (%1,3) hastada motor, 85 (%22,9) hastada duyuşal ve motor liflerin birlikte etkilendiği mixt tip polinöropati mevcuttu. Grup II' de 71 olguda normal EMG bulguları belirlendi (Tablo 2).

Tablo 1. Olguların demografik, semptom ve nörolojik muayene bulguları

		Toplam		Cinsiyet		p
				Erkek	Kadın	
		371		315; %84,9	56; %15,1	0,001*
	Grup I (n; %)	250; %67,4		219; %87,6	31; %12,4	0,067
	Grup II (n; %)	121; %32,6		96; %79,3	25; %20,7	
	p	0,001*				
Yaş, ort±SD (min-max)	Grup I	62±8,59 (31-77)	63,87±7,53			0,189
	Grup II	58,21±9,37		62,29±8,43	60,51±9,37	
	p	0,001*				
Semptom, (n; %)	Duyusal Pozitif	203; %54,7		175; %55,6	28; %50,0	0,442
	Duyusal Negatif	247; %66,6		207; %65,7	40; %71,4	0,404
	Motor	81; %21,8		68; %21,6	13; %23,2	0,576
	Ağrı	127; %34,2		106; %33,7	21; %37,5	0,786
	Dizestezi	181; %48,8		157; %49,8	24; %42,9	0,335
	Parestezi	191; %51,5		164; %52,1	27; %48,2	0,595
Nörolojik Muayene, (n; %)	Yüzeysel Duyu	216; %58,2		190; %60,3	26; %46,4	0,052
	Derin Duyu	138; %37,2		115; %36,5	23; %41,1	0,515
	Motor	75; %20,2		63; %20,0	12; %21,4	0,806
	Serebellar	102; %27,5		90; %28,6	12; %21,4	0,270

Grup I: EMG ile saptanan polinöropati olguları

Grup II: Nöropati semptomu olup elektormiyografik olarak polinöropati saptanamayan olgular

*p<0,05; İstatistiksel düzeyde anlamlı olarak kabul edildi.

Çalışmaya dahil edilen olgularda cinsiyet ile yaş, başlangıç semptomları ve nörolojik muayene bulguları arasında anlamlı fark gözlenmedi (Tablo 1). Grup I' de negatif duyusal semptomlar ile motor semptomlar, Grup II 'de dizestezi ve parestezi semptomları istatistiksel anlamlılıkta yüksek oranda gözlemlendi (p=0.001, p=0.001, p=0.001, p=0.001) (Tablo 2). Pozitif duyusal ve ağrı semptomları açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.399, p=0.740) (Tablo 2). Diğer taraftan derin duyu kusuru saptanan olgular Grup II' de anlamlı derecede daha yüksekti (n:58; %47,9; p=0,003) (Tablo 3).

Nöropati semptomları arasında en sık gözlemlenen negatif duyusal semptomlara sahip olguların (n:247, %65,0) nörolojik muayenelerinde yüzeysel ve derin duyu kusuru bulguları yüksek oranda gözlemlendi. Ayrıca istatistiksel olarak anlamlı olmasa da ataksi,

dismetri gibi serebellar sistem bulguları en yoğun bu grupta saptandı (n:72, %29,1; p=0,313, Tablo 3). Elektrofizyolojik olarak ise en sık saf duyusal tip polinöropatinin eşlik ettiği gözlemlendi (Tablo 2).

Pozitif duyusal semptom 203 hastada gözlemlendi. Nörolojik muayenelerinde belirgin olarak yüzeysel duyu kusuru ön planda olmakla birlikte pozitif duyusal semptomu olmayan gruba göre karşılaştırıldığında motor bulgular anlamlı ölçüde daha fazla idi (p=0,001) (Tablo 3).

Tablo 2. Semptomların EMG bulgularına göre değerlendirilmesi

	Semptom, (n; %)						
	Duyusal Pozitif	DuyusalNegatif	Motor	Ağrı	Dizestezi	Parestezi	Toplam
Polinöropati varlığı,							
Grup I	133; 53,2%	189; 75,6%	71; 28,4%	87; 34,8%	92; 36,8%	122; 48,8%	250; 67,4%
Grup II	70; 57,9%	58; 47,9%	10; 8,3%	40; 33,1%	89; 73,6%	79; 65,3%	121; 32,6%
p	0,399	0,001*	0,001*	0,740	0,001*	0,003*	
Grup I							
Duyusal PNP	66; 32,5%	145; 58,7%	2; 2,5%	18; 14,2%	50; 27,6%	68; 35,6%	160; 43,1%
Motor PNP	0	1; 0,4%	4; 4,9%	4; 3,1%	0	0	5; 1,3%
Mixt tip PNP	67; 33,0%	43; 17,4%	65; 80,2%	65; 51,2%	42; 23,2%	46; 24,1%	85; 22,9%
Grup II							
Normal	38; 18,7%	40; 16,2%	0	9; 7,1%	54; 28,7%	57; 29,8%	71; 27%
NMKH	4; 2,0%	0	6; 7,4%	2; 1,6%	4; 3,3%	0;	6; 1,6%
Radikülopati	5; 2,5%	5; 2,0%	4; 4,9%	5; 3,9%	4; 2,2%	2; 1,0%	5; 1,3%
TuzakNöropatisi	13; 6,4%	11; 4,5%	0	14; 11,0%	11; 6,1%	10; 5,2%	18; 4,9%
H refleks değişikliği	10; 4,9%	2; 0,8%	0	10; 7,9%	16; 8,8%	8; 4,2%	21; 5,7%

Grup I: EMG ile saptanan polinöropati olguları,

Grup II: Nöropati semptomu olup elektormiyografik olarak polinöropati saptanamayan olgular

PNP; Polinöropati

*p<0,05; İstatistiksel düzeyinde anlamlı olarak kabul edildi.

Motor bulgular özellikle alt ekstremitelerde ve MRC skalasına göre -5/5 ile 4/5 arasında hafif oranda idi. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte bu grupta saf duysal ve mixt tip polinöropati daha sık olarak saptandı (Tablo 2).

Sadece güçsüzlük semptomu ile başvuran 81 hastanın %92,6'ında (n:75) muayenelerinde özellikle alt ekstremitelerde ve distal hakimiyetli MRC skalasına göre 0/5 ile -5/5 arasında değişik derecelerde kas gücü kaybı mevcuttu. Ayrıca başvuru semptomları arasında belirgin olmamasına rağmen hastaların nörolojik muayenelerinde %39,5'unda (n:32) yüzeysel duyu kusuru, %16,0'ında (n:13) derin duyu kusuru ve %14,8'inde (n:12) patolojik serebellar bulgular mevcuttu. Ağrı şikayetinin belirgin olduğu hastalarda (n:127; %34,2) nörolojik muayenelerinde özellikle alt ekstremitelerde belirgin kas gücü kaybının eşlik ettiği motor bulguların istatistiksel anlamlılıkta belirgin olduğu (p=0,001, Tablo 3) ve EMG'de sıklıkla mixt tip polinöropati varlığı gözlemlendi.

Hastaların 81'inde (%48,8) dizestezi ve 191'inde (%51,5) parestezisi saptandı. Dizestezi olan hastaların nörolojik muayenelerinde

istatistiksel olarak anlamlı ölçüde derin duyu kusuru belirgindi (n:81; %42,6, p=0,026) (Tablo 3). Ayrıca duysal ve motor semptom varlığı yaş ve cinsiyet açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (Tablo 4).

Hastaların çoğunda (n:354, %95,4) kombinasyon tedavisi mevcuttu. Kemoterapi rejimleri arasında İsplatin- Vinorelbine (n:47, %12,7), Cisplatin- Doksetaksel (n:82, %22,1), Cisplatin- Etoposide (n:55, %14,8), Cisplatin- Gemsitabine (n:25, %6,7) ve Paklitaxel- Carboplatin (n:145, %39,1) kombinasyon tedavileri mevcuttu. Ayrıca hastaların çoğunda (n:226, %60,9) tedavide Cisplatin yer almaktaydı. Nöropati semptomu olan ve EMG ile kalın lif tutulumu saptanan 250 (%67,4) hastadan 160'ında (%43,1) saf duysal, 85'inde (%22,9) ise mixt tip polinöropati saptandı (Tablo 5).

TARTIŞMA

Bu çalışmada akciğer kanseri tanılı olgularda kemoterapi tedavisi sonrası gelişen toksik noropatilere sahip olgular klinik ve elektrofizyolojik açıdan değerlendirildi. Tüm olgularda en sık başvuru semptomu duysal semptomlardı. Elektrofizyolojik veriler, negatif

duyusal semptomların belirgin olduğu hasta grubunda saf duyusal, motor semptomların belirgin olduğu grupta ise hem duyusal hem de motor liflerin etkilendiği mikst tip polinöropati varlığının ön planda olduğunu gösterdi.

Elektrofizyolojik olarak polinöropati saptanan olgularda negatif duyusal ve motor semptomlar, saptanmayan grupta ise dizestezi ve parestezi semptomları istatistiksel anlamlılıkta yüksek oranda saptandı.

Tablo 3. Nörolojik muayene bulguları ve semptom karşılaştırılması

			Nörolojik Muayene, (n; %)			
			Yüzeysel Duyu	Derin Duyu	Motor	Serebellar
			216; %58,2	138; %37,2	75; %20,2	102; %27,5
Semptom	Grup I	250; %67,4	184; %73,6	80; %32,0	69; %27,6	75; %30,0
	Grup II	121; %32,6	32; %26,4	58; %47,9	6; %5,0	27; %22,3
	p	0,001	0,001	0,003	0,001	0,120
Duyusal Pozitif	Grup I	203; %54,7	102; %50,2	36; %17,7	57; %28,1	19; %9,4
	Grup II	168; %45,3	114; %67,9	102; %60,7	18; %10,7	83; %49,4
	p		0,001	0,001	0,001	0,001
Duyusal Negatif	Grup I	247; %65,0	203; %82,2	106; %42,9	37; %15,0	72; %29,1
	Grup II	124; %33,4	13; %10,5	32; %25,8	38; %30,6	30; %24,2
	p		0,001	0,001	0,001	0,313
Motor	Grup I	81; %22,9	32; %39,5	13; %16,0	75; %92,6	12; %14,8
	Grup II	290; %78,2	184; %63,4	125; %43,1	6; %7,4	90; %31,0
	p		0,001	0,001	0,001	0,004
Ağrı	Grup I	127; %34,2	46; %36,2	30; %23,6	55; %43,0	18; %17,6
	Grup II	244; %65,8	170; %69,7	108; %44,3	20; %8,2	84; %34,4
	p		0,001	0,001	0,001	0,001
Dizestezi	Grup I	181; %48,8	80; %44,2	81; %42,6	34; %18,8	31; %17,1
	Grup II	190; %51,2	136; %71,6	57; %31,5	41; %21,6	71; %37,4
	p		0,001	0,026	0,503	0,001
Parestezi	Grup I	191; %51,5	96; %50,3	55; %28,8	40; %22,2	31; %16,2
	Grup II	180; %48,5	120; %66,7	83; %46,1	35; %18,3	71; %39,4
	p		0,001	0,001	0,537	0,001

Grup I: EMG ile saptanan polinöropati olguları,

Grup II: Nöropati semptomu olup elektromiyografik olarak polinöropati saptanmayan olgular

*p<0,05; İstatistiksel düzeyinde anlamlı olarak kabul edildi.

Kemoterapi ilişkili toksik noropati semptomları sıklıkla duyusaldır¹⁴. Çogunlukla duyusal lifler etkilendiği için, parestezi, dizestezi, duyusal ve derin duyu kaybı ve ağrı gibi yakınmalar belirgindir. Özellikle nörotoksik ajanlara karşı korunmasız olduğu düşünülen uzun lifli duyusal aksonlarda ekstremite dist alinde norotoksik hasara bağlı olarak eldiven çorap tarzında duyusal kusur ile karşımıza çıkmaktadır^{15,16}. Bu çalışmada olguların çoğunda duyusal semptomlar on planda olup, EMG incelemelerinde saf duyusal ve mixt tip polinöropati mevcuttu. Özellikle uyuşma ve karıncalanma gibi duyusal semptom

varlığı düşme riskini önemli oranda arttırmakta ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Ayrıca ağır vakalarda, bu semptomlar duyusal algılamının kaybolmasına yol açabilecek şekilde progrese olabilir ve gelişen derin duyu kusurları ve denge kayıpları düşme riskini arttırabilir¹⁷⁻¹⁹. Olgularımızda da derin duyu kusuru ve ataksi sık olarak gözlemlendi. Özellikle Grup II' de derin duyu kusuru anlamlı ölçüde belirgin olup bu hastalarda negatif duyusal semptomlar da sıklıkla saptandı. Duyusal semptom ya da muayene ile saptanan duyusal kusurlar her zaman elektrofizyolojik olarak kayıt altına alabilmek mümkün olamamaktadır. Özellikle inceleme alanı dışında

kalan anatomik yapılardaki tutulumu gösterebilmek için daha kapsamlı incelemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Retrospektif olarak verilerin değerlendirildiği bu çalışmada olgulardaki derin duyu kusuru veya ince lif nöropatisini ortaya koyabilecek elektrofizyolojik bilgilere ulaşılamamıştır.

Tablo 4. Semptomların yaş ve cinsiyet açısından karşılaştırılması

		Yaş	Cinsiyet	
			Erkek	Kadın
Duyusal Pozitif	Grup I	61,88±8,45	175; %86,2	28; %13,8
	Grup II	62,19±8,77	140; %88,3	28; %16,7
	p	0,731		0,442
Duyusal Negatif	Grup I	62,33±8,65	207; %83,8	40; %16,2
	Grup II	61,41±8,46	108; %87,1	16; %12,9
	p	0,332		0,404
Motor	Grup I	63,17±8,76	68; %84,0	13; %16,0
	Grup II	61,71±8,53	247; %85,2	43; %14,8
	p	0,177		0,786
Ağrı	Grup I	63,00±8,59	106; %83,5	21; %16,5
	Grup II	61,52±8,56	209; %85,7	35; %14,3
	p	0,115		0,576
Dizestezi	Grup I	61,50±9,35	157; %86,7	24; %13,3
	Grup II	62,53±7,78	158; %83,2	32; %16,8
	p	0,252		0,335
Parestezi	Grup I	61,59±8,08	169; %84,1	32; %15,9
	Grup II	62,54±9,14	146; %85,9	24; %14,1
	p	0,287		0,629

Grup I: EMG ile saptanan polinöropati olguları,

Grup II: Nöropati semptomu olup elektromiyografik olarak polinöropati saptanamayan olgular

*p<0,05; İstatistiksel düzeyinde anlamlı olarak kabul edildi.

Kemoterapi ilişkili toksik noropati gelişimi kullanılan ajana bağlı olarak %30-70 arasında değişmektedir. Ajanın türü dışında kümülatif dozu ve birden fazla ajanın kombine uygulanım noropati riskini arttırmaktadır^{1,2}. Histopatolojik olarak genellikle kalın miyelini liflerde değişiklikler gözlenir^{2,7,9}. Çoğunlukla duyusal semptomların belirgin olduğu olgular ile birlikte, motor semptomlar ciddi fonksiyonel disabiliteye neden olabilecek boyutta olabilir²⁰. Taksan, platinum ve vinka alkaloidleri en sık kemoterapi ilişkili toksik noropati ile ilişkilendirilen ajanlar içinde yer almaktadır^{5,6}. Cisplatin kaynaklı kemoterapi ilişkili toksik nöropatide çoğunlukla mikst tip nöropati gözlenir. Tat ve vibrasyon kaybı, parestezi,

guçsuzluk ve tremor sıklıkla gözlenen bulgular arasındadır¹¹. Toksik noropatide motor liflerin etkilenmesi daha yüksek dozlarda ve nadir olarak gözlenmektedir. Motor bulgular arasında distal güçsüzlük, yürüme ve denge bozuklukları ve ince hareketlerde bozulma gözlenebilir¹¹. Motor yetmezlik ilerleyebilir ve belirgin fonksiyonel kayıplara neden olabilir²⁰. Tedavide taksan gruplarının yüksek dozda kullanımı özellikle distalhakimiyetli kas krampları ve ağrının eşlik ettiği motor ve otonomik disfonksiyon gelişimini arttırmaktadır^{4,11}. Olgularımızda motor semptom varlığı literatüre göre daha yüksek oranda (n:81, %21,8) olup, bu grupta hastaların %87,6'ında elektrofizyolojik olarak mikst tip ya

da pür motor polinöropati varlığı mevcuttu. Yine bu grupta ağrı ve derin duyu kusurları görece daha sık gözlenmekteydi. Kemoterapötik ajanın özelliğine göre ağırlıklı etkilenen lif tipi değişebilir ve klinik değişkenlik gözlenebilir²¹⁻²⁵. Akciğer kanseri

tedavi rejimlerinde sıklıkla yer alan cisplatin ve taxel kullanımının bizim olgularımızda belirgin olması literatüre oranla daha yüksek oranda saptadığımız motor semptomları ve bu olgularda daha sık saptanan derin duyu kusurları ve ağrı varlığını açıklamaktadır.

Tablo 5. Kemoterapi ajanları ile elektrofizyolojik verilerin karşılaştırılması

	Grup I		Grup II		Total
	N	Duyusal	Mikst	Motor	
Paklitaxel + Carboplatin	56 (38,6)	65 (44,8)	23 (15,9)	1 (0,7)	145 (39,1)
Cisplatin + Doketaksel	31 (37,8)	30 (36,6)	20 (24,4)	1 (1,2)	82 (22,1)
Cisplatin + Etoposide	4 (7,3)	37 (67,3)	13 (23,6)	1 (1,8)	55 (14,8)
Cisplatin + Vinorelbine	13 (27,7)	16 (34,0)	17 (36,2)	1 (2,1)	47 (12,7)
Cisplatin + Gemsitabine	12 (48,0)	6 (24,0)	7 (28,0)	0	25 (6,7)
Cisplatine	5 (29,4)	6 (35,3)	5 (29,4)	1 (5,9)	17 (4,6)
	121 (32,6)	160 (43,1)	85 (22,9)	5 (1,3)	371

Grup I: EMG ile saptanan polinöropati olguları,

Grup II: Nöropati semptomu olup elektromiyografik olarak polinöropati saptanamayan olgular

Kanser tedavisini takiben önemli bir komorbidite nedeni olan periferik nöropatiler çoğunlukla ağrılı olabilir ve yaşam kalitesinde ciddi azalmaya neden olabilmektedir²⁵. Nöropati gelişmeden özellikle kür dönemlerinde kavşak kaslarında belirgin akut ağrı sendromu sık gözlenmektedir²⁴. Olgularımızın %34,2 (n:127)'inde tedavinin devam ettiği dönemde belirgin nöropatik ağrı varlığı saptandı. Bu grupta özellikle alt ekstremitelerde belirgin parezinin eşlik ettiği mixt tip polinöropati mevcuttu. Ağrı semptomlarının daha geri planda olması Monfort ve arkadaşlarının da belirttiği gibi terminoloji ile ilgili olabilir ki çoğu zaman yanma, donma, batma, karıncalanma gibi semptomlar ağrıdan ziyade sensorial olarak tanımlanmaktadır²⁷. Ağırlıklı olarak C liflerinin hasarında gelişen ağrı, dizestezi ve parestezi gibi semptomlar daha çok klinik değerlendirme ile belirlenebilir. Bizim çalışmamızda da EMG bulguları normal sınırdaki değerlendirilen

olgularda dizestezi ve parestezi görülme oranı daha yüksekti. Bu hastalarda nöropati takibinde EMG'nin tek başına yeterli olmayacağını ve özellikle klinik semptom ve nörolojik muayenenin önemini göstermektedir.

Retrospektif kesitsel tanımlayıcı olan bu çalışmanın en önemli limitasyonu olası paraneoplastik polinöropatilerin dışlanamamasıdır. Akciğer kanserinde eşlik eden paraneoplastik sendromlar içerisinde periferik nöropatiler literatürde sıklıkla vaka bazında bildirilmiştir^{28,29}. Özellikle kemoterapi tedavisi ile birlikte nöropati semptomu gelişen hastalar çalışmaya alınmış olsa da paraneoplastik nöropatilerin retrospektif veriler ile ayırt edilmesi mümkün olamayabilir.

Sonuç olarak kemoterapiye bağlı nöropati farklı lifleri etkileyebilmekte ve farklı klinik tablolar ile karşımıza çıkabilmektedir. Henüz bilinen hiçbir önleyici veya iyileştirici tedavi bulunmamaktadır. Klinik semptomların tedavi süresince takibi nöropatinin erken dönemde

saptanmasını, önlemlerin erken dönemde alınmasını sağlayabilir ve dolayısı ile komorbidite üzerindeki etkileri azaltılabilir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Bu çalışmada çıkar çatışması yoktur.

Finansal Destek: Bu çalışma herhangi bir fon tarafından desteklenmemiştir.

Declaration of Conflicting Interests: There is no conflict of interest in this study.

Financial Disclosure: No financial support was received.

KAYNAKLAR

1. Quasthoff S, Hartung HP. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy. *J Neurol.* 2002; 249: 9-17.
2. Han Y, Smith MT. Pathobiology of cancer chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN). *Front Pharmacol.* 2013; 18: 4: 156.
3. Argyriou AA, Kyritsis AP, Makatsoris T, Kalofonos HP. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy in adults: a comprehensive update of the literature. *Cancer Manag Res.* 2014; 6: 135-47.
4. Park SB, Goldstein D, Krishnan AV, et al. Chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity: A critical analysis. *CA Cancer J Clin.* 2013; 63: 419-37.
5. Al-Atiyyat N, Obaid A. Management of peripheral neuropathy induced by chemotherapy in adults with cancer: a review. *Int J Palliat Nurs.* 2017 Jan 2; 23: 13-7.
6. Kerckhove N, Pereira B, Pezet D, Balayssac D. Clinical assessment of new antineuropathic strategies for chemotherapy-induced peripheral neuropathy: pain should not be the principal endpoint. *Pain.* 2017; 158: 180-2.
7. Cata JP, Weng HR, Burton AW, Villareal H, Giralt S, Dougherty PM. Quantitative sensory findings in patients with bortezomib-induced pain. *J Pain.* 2007 Apr; 8: 296-306.
8. Wilkes G. Peripheral neuropathy related to chemotherapy. *Semin Oncol Nurs.* 2007 Aug; 23: 162-73.
9. Gutierrez-Gutierrez G, Sereno M, Miralles A, Casado-Saenz E, Gutierrez Rivas E. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy: clinical features, diagnosis, prevention and treatment strategies. *Clin. Transl. Oncol.* 2010; 12: 81-91.
10. Seretny M, Currie GL, Sena ES, et al. Incidence, prevalence, and predictors of chemotherapy-induced peripheral neuropathy: a systematic review and meta-analysis. *Pain.* 2014; 155: 2461-70.
11. Dougherty PM, Cata JP, Cordella JV, Burton A, Weng HR. Taxol-induced sensory disturbance is characterized by preferential impairment of myelinated fiber function in cancer patients. *Pain.* 2004 May; 109: 132-42.
12. Johnson C, Pankratz VS, Velazquez AI, et al. Candidate pathway-based genetic association study of platinum and platinum-taxane related toxicity in a cohort of primary lung cancer patients. *J. Neurol. Sci.* 2015; 349: 124-8.
13. Paternostro-Sluga T, Grim-Stieger M, Posch M, et al. Reliability and validity of the Medical Research Council (MRC) scale and a modified scale for testing muscle strength in patients with radial palsy. *J Rehabil Med.* 2008 Aug; 40: 665-71.
14. Krishnan AV, Goldstein D, Friedlander M, Kiernan MC. Oxaliplatin-induced neurotoxicity and the development of neuropathy. *Muscle Nerve.* 2005; 32: 51-60.
15. Rowinsky EK, Chaudhry V, Cornblath DR, Donehower RC. Neurotoxicity of Taxol. *J Natl Cancer Inst Monogr.* 1993; 15: 107-15.
16. Reyes-Gibby CC, Morrow PK, Buzdar A, Shete S. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy as a predictor of neuropathic pain in breast cancer patients previously treated with paclitaxel. *J Pain.* 2009; 10: 1146-50.
17. Kolb NA, Smith AG, Singleton JR, et al. The Association of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy Symptoms and the Risk of Falling. *JAMA Neurol.* 2016; Jul 1; 73: 860-6.
18. Ganz DA, Bao Y, Shekelle PG, Rubenstein LZ. Will my patient fall? *JAMA.* 2007; 297: 77-86.
19. Strumberg D, Brugge S, Korn MW, et al. Evaluation of long-term toxicity in patients after cisplatin-based chemotherapy for non seminomatous testicular cancer. *Ann. Oncol.* 2002; 13: 229-36.
20. Hile ES, Fitzgerald GK, Studenski SA. Persistent mobility disability after neurotoxic chemotherapy. *Phys Ther.* 2010 Nov; 90: 1649-57.
21. Gutiérrez-Gutiérrez G, Sereno M, Miralles A, Casado-Saenz E, Gutiérrez-Rivas E. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy: clinical features, diagnosis, prevention and treatment strategies. *Clin Transl Oncol.* 2010 Feb; 12: 81-91.

22. Fernandes R, Mazzarello S, Hutton B, et al. Taxane acute pain syndrome (TAPS) in patients receiving taxane-based chemotherapy for breast cancer-a systematic review. *Support. Care Cancer*. 2016; 24: 3633-50.
23. Loprinzi CL, Maddocks-Christianson K, Wolf SL, et al. The Paclitaxel acute pain syndrome: sensitization of nociceptors as the putative mechanism. *Cancer J*. 2007; 13: 399-403.
24. Loprinzi CL, Reeves BN, Dakhil SR, et al. Natural history of paclitaxel-associated acute pain syndrome: prospective cohort study NCCTG N08C1. *J Clin Oncol*. 2011; 29: 1472-8.
25. Amptoulach, S., and Tsavaris, N. Neurotoxicity caused by the treatment with platinum analogues. *Chemother. Res. Pract.* 2011; 2011: 843019.
26. Wolf S, Barton D, Kottschade L, Grothey A, Loprinzi C. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy: prevention and treatment strategies. *Eur J Cancer*. 2008; 44: 1507-15.
27. Monfort SM, Pan X, Patrick R, et al. Gait, balance, and patient-reported outcomes during taxane-based chemotherapy in early-stage breast cancer patients. *Breast Cancer Res Treat*. 2017 Jul; 164: 69-77.
28. Koike H, Tanaka F, Sobue G. Paraneoplastic neuropathy: wide-ranging clinicopathological manifestations. *Curr Opin Neurol*. 2011; 24: 504-10.
29. Raspotnig M, Vedeler C, Storstein A. Paraneoplastic neurological syndromes in lung cancer patients with or without onconeural antibodies. *J Neurol Sci*. 2015; 15: 348: 41-5.